

Desinfektionsplan ambulanter Pflegedienst



Was?	Wann?	Womit?	Dosierung	Einwirkzeit	Wie?	Wer?
 Hygienische Händedesinfektion	bei Arbeitsbeginn, nach Pausen und Toilettengang, vor Umgang mit Lebensmitteln, nach dem Ablegen von Handschuhen, vor / nach jeder Behandlung, nach dem Kontakt mit infektiösen Personen / Material	MaiMed MyClean HB OpSept	gebrauchsfertig	30 Sekunden	Hände vollständig mit Präparat benetzen (Hohlhand gefüllt), 30 Sekunden lang feuchthalten und gegeneinander reiben.	alle Mitarbeiter
 Händewaschung	bei Arbeitsbeginn, vor Pausen, vor Umgang mit Lebensmitteln, nach Tierkontakt, nach Toilettengang, nach Arbeitsende, bei Verschmutzung, bei Bedarf	MaiMed MyClean WL	gebrauchsfertig	30 Sekunden	Hände mit Waschlotion und Wasser waschen, abspülen, mit Einmalhandtüchern trocknen.	alle Mitarbeiter
 Hautschutz	vor Arbeitsbeginn, nach Pausen, vor Feucharbeiten, bei Bedarf	MaiMed MyClean Handlotion lipid (W/O)	gebrauchsfertig		gründlich in die Hände einmassieren, auf Partien zwischen den Fingern, Nagelfalten und auf dem Handrücken achten	alle Mitarbeiter
 Hautpflege	vor Pausen, nach der Arbeit, nach jeder Hautreinigung (wenn kein Hautschutz erforderlich), bei Bedarf	MaiMed MyClean Handlotion (O/W)	gebrauchsfertig		gründlich in die Hände einmassieren, auf Partien zwischen den Fingern, Nagelfalten und auf dem Handrücken achten	alle Mitarbeiter
 Vorbeugender Hautschutz	bei allen Arbeiten, bei denen die Möglichkeit der Kontamination mit Blut, Sekreten und Ausscheidungen gegeben ist sowie im Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen	unsterile Untersuchungshandschuhe nach EN 455 1-4, puderfrei ggf. sterile OP-Handschuhe nach EN 455 1-4, puderfrei <u>Umgang mit Chemikalien / Desinfektionsmitteln</u> dickwandige Schutzhandschuhe nach EN 374 1, 2, 3 mit langem Schaft			Über die trockene Hand ziehen. Desinfektionsmittel und Hautschutzcreme / Hautpflegelotion müssen vollständig abgetrocknet / eingezogen sein.	alle Mitarbeiter
 Hautantiseptik	vor der Behandlung	MaiMed MyClean A	gebrauchsfertig	15 Sekunden 1 Minute (talgdrüsenreiche Haut)	Hautpartien einsprühen / einreiben und einwirken lassen.	Pflegepersonal
 Instrumente	möglichst Einmalinstrumente verwenden sofort nach Gebrauch	MaiMed MyClean IN im Ultraschallbad:	3 % 3 %	30 Minuten 5 Minuten	Gemäß Instrumenten- / Desinfektionsmittelherstellerrangaben in eine Instrumentenwanne einlegen.	Pflegepersonal
 Med. Geräte z. B. Stethoskope, Blutdruckmanschetten, Fieberthermometer	vor und nach jeder Benutzung, bei Kontamination sofort	MaiMed MyClean DS MaiMed MyClean DS A MaiMed MyClean DS OA	gebrauchsfertig	1 Minute	Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.	Pflegepersonal
 Waschbecken & Toiletten	1x täglich bei Bedarf	MaiMed MyClean FD MaiMed MyClean DS MaiMed MyClean DS A MaiMed MyClean DS OA	0,5 % gebrauchsfertig	5 Minuten 1 Minute	Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.	Reinigungspersonal Pflegepersonal

Desinfektionsplan ambulanter Pflegedienst



Was?	Wann?	Womit?	Dosierung	Einwirkzeit	Wie?	Wer?
<p>Waschschüsseln, Dusch- und Toilettenstühle</p>	<p><u>nicht Patientenbezogen:</u> nach jedem Gebrauch</p> <p><u>Patientenbezogen:</u> gem. Hygieneplan</p>	<p>MaiMed MyClean FD</p> <hr/> <p>MaiMed MyClean DS</p> <p>MaiMed MyClean DS A</p> <p>MaiMed MyClean DS OA</p>	<p>0,5 %</p> <hr/> <p>gebrauchsfertig</p>	<p>5 Minuten</p> <hr/> <p>1 Minute</p>	<p>Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.</p>	<p>Pflegepersonal</p>
<p>Kleine Flächen / Pflegehilfsmittel z. B. Arbeitsfläche, Nierenschalen</p>	<p>bei Benutzerwechsel, bei sichtbarer Kontamination und bei vorhandenen Infektionen</p>	<p>MaiMed MyClean FD</p> <hr/> <p>MaiMed MyClean DS</p> <p>MaiMed MyClean DS A</p> <p>MaiMed MyClean DS OA</p>	<p>0,5 %</p> <hr/> <p>gebrauchsfertig</p>	<p>5 Minuten</p> <hr/> <p>1 Minute</p>	<p>Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.</p>	<p>Reinigungspersonal</p> <p>Pflegepersonal</p>
<p>Große Flächen z. B. Fußboden</p>	<p>bei sichtbarer Kontamination und bei vorhandenen Infektionen</p>	<p>MaiMed MyClean FD</p>	<p>0,5 %</p>	<p>5 Minuten</p>	<p>Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.</p>	<p>Reinigungspersonal</p> <p>Pflegepersonal</p>
<p>Fahrzeug Innenraum z. B. Ablagen, Lenkrad, Armaturen, Schaltknäufel</p>	<p>1-2x monatlich, nach Kontamination, bei Bedarf</p>	<p>MaiMed MyClean FD</p> <hr/> <p>MaiMed MyClean DS</p> <p>MaiMed MyClean DS A</p> <p>MaiMed MyClean DS OA</p>	<p>0,5 %</p> <hr/> <p>gebrauchsfertig</p>	<p>5 Minuten</p> <hr/> <p>1 Minute</p>	<p>Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.</p>	<p>Reinigungspersonal</p> <p>Pflegepersonal</p>
<p>Abfalleimer</p>	<p>1x täglich bei Bedarf</p>	<p>MaiMed MyClean FD</p> <hr/> <p>MaiMed MyClean DS</p> <p>MaiMed MyClean DS A</p> <p>MaiMed MyClean DS OA</p>	<p>0,5 %</p> <hr/> <p>gebrauchsfertig</p>	<p>5 Minuten</p> <hr/> <p>1 Minute</p>	<p>Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.</p>	<p>Reinigungspersonal</p> <p>Pflegepersonal</p>
<p>Schutzkleidung</p>	<p>vor / bei Betreten des Zimmers</p>	<p>Verwendung der Produkte gem. Hygieneplan (z. B. Schutzkittel, Mund-Nasen-Schutz, Einmalhandschuhe)</p> <p>Entsorgung / Aufbereitung gem. im Hygieneplan festgelegten Verfahren</p>		<p>Einmalbekleidung: dem Abfall zuführen</p> <p>Mehrwegbekleidung: desinfizierend waschen</p>	<p>Reinigungspersonal</p> <p>Pflegepersonal</p>	

Merke:

Für die Durchführung aller Desinfektionsarbeiten sind die Regeln der **TRBA 250** verbindlich. **Konzentration** und **Einwirkzeit beachten**. Bei Desinfektionslösungen immer zuerst kaltes Wasser, dann Desinfektionsmittel zugeben. Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht zur Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind geeignete **Schutzhandschuhe** zu tragen (Sicherheitsdatenblatt beachten). Über die Inhalte des Desinfektionsplans sind den Mitarbeitern der Einrichtung mindestens jährlich zu unterweisen. (Grundlagen sind: § 4 BGV A1, § 12 BioStoffV, § 12 ArbSchG). Die Unterweisungen sind schriftlich festzuhalten.

Dieser Plan ist auf Basis aktueller Empfehlungen und Richtlinien erstellt – Die Überprüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit obliegt dem Anwender.